

Sehr geehrte(r) Patient (in),
der Gerinnungshemmer **Lixiana** (Wirkstoff Edoxaban) wird bei folgenden Patienten
verordnet:

- Behandlung einer tiefen Beinvenenthrombose und/oder Lungenembolie
- langfristige Vorbeugung von tiefen Beinvenenthrombosen/Lungenembolie
- Verhinderung von Schlaganfällen bei Patienten mit Vorhofflimmern

Folgendes ist für Sie als Patient bei der Einnahme zu beachten:

Ihre persönliche aktuelle Dosis:

30 / 60 mg 1x tgl.

Bitte immer den Lixiana-Notfallausweis bei sich tragen!
Ihre Nierenfunktion (sog. Kreatinin-Clearance) sollte halbjährlich kontrolliert werden
Regelmässige Gerinnungskontrollen sind nicht notwendig
Die Gerinnungswerte Quick/INR und PTT können beeinflusst werden
Sie sollten Aspirin-haltige Schmerzmittel (die den Wirkstoff „ Acetylsalicylsäure “ enthalten) vermeiden, auch Naproxen vermeiden . Besser: Ibuprofen, Paracetamol, Arcoxia, Novalgin
Kein Einfluss der Art der Ernährung auf Lixiana
Vor einem operativen Eingriff oder Impfung reicht eine 24-stündige Einnahmepause
Das Vorgehen nach der OP wird individuell festgelegt je nach Blutungs- und Thromboserisiko der OP
für Frauen im gebärfähigen Alter: - bitte unter der Einnahme von Xarelto sicher verhüten , eine fruchtschädigende Wirkung ist möglich - eine Verstärkung der Monatsblutung ist möglich. Falls dies problematisch ist, bitte Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt
Wechselwirkung mit anderen Medikamenten: - Wirkungsverstärkung durch: Ciclosporin, Erythromycin, Dronedaron, Ketoconazol, - Wirkungsabschwächung: Johanniskraut, Chinidin Verapamil, Amiodaron, Rifampicin, Phenytoin, Carbamazepin, Phenobarbital
Bitte informieren Sie behandelnde Ärzte (z.B. Zahnarzt) über die Einnahme
Mögliches Antidot bei Blutung: Tranexamsäure 20 mg/kg Kg, ggf. PPSB 50 IE/kg KG oder NovoSeven 90 µg/kg KG